



病棟： 一般
 期間： 3カ月毎
 指標： 急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率
 目的： 廃用症候群や合併症の予防・改善に繋げ、患者の早期社会復帰およびQOL向上のため。
 組織として遵守されているか早期リハビリテーションの実施はガイドラインで推奨されており、
 (入院期間中のマネジメントがしっかりなされているか)をはかることができる指標と考えられる。

分子： 分母のうち、入院してから4日以内にリハビリテーションが開始された患者数
 分母： 急性脳梗塞(発症時期が3日以内)の退院患者のうち、リハビリテーションが施行された退院患者数

2017年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度
分子		2			2			2					6
分母		2			2			2					6
開始率		100%			100%			100%					100%

2016年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度
分子		11			6			8			2		27
分母		11			6			8			2		27
開始率		100%			100%			100%			100%		100%

2015年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度
分子		4			3			4			1		12
分母		5			3			5			1		14
開始率		80%			100%			80%			100%		86%

2014年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度
分子		2			0			6			3		11
分母		2			1			6			3		12
開始率		100%			0%			100%			100%		92%