



病棟： 一般
 期間： 半年毎
 指標： 術後の肺血栓塞栓症発生率
 目的： 術後の肺血栓塞栓症発生させないため。肺血栓塞栓症に関するガイドラインにおいて予防を推奨されており、組織として遵守されているか(病院の統率力)をはかることができる指標と考えられる。

分子： 術後肺血栓塞栓症の発生件数
 分母： 全身麻酔かつ肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数

2018年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度
分子	0												0
分母	52												52
発生率	0.0%												0.0%

2017年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度
分子	0						0						0
分母	50						54						104
発生率	0.0%						0.0%						0.0%

2016年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度
分子	0						0						0
分母	52						27						79
発生率	0.0%						0.0%						0.0%

2015年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度
分子	0						0						0
分母	112						95						207
発生率	0.0%						0.0%						0.0%

2014年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度
分子	0						0						0
分母	174						106						280
発生率	0.0%						0.0%						0.0%